

**Stilaxx**® Rodzina produktów



**Stilaxx**®  
**Syrop Przeciwkaszlowy**  
*dla dorosłych*

- Szybka ulga w suchym kaszlu
- Dla dorosłych i młodzieży od 12. roku życia
- Bez alkoholu i bez cukru
- Odpowiedni do stosowania w dzień i w nocy



**Smak**  
**ziołowy**



**Stilaxx**® junior  
**Syrop Przeciwkaszlowy**  
*dla dzieci*

- Szybka ulga w suchym kaszlu
- Dla dzieci i maluchów od 1. roku życia
- Smak przyjazny dla dzieci
- Bez alkoholu i bez cukru
- Odpowiedni do stosowania w dzień i w nocy



**Smak**  
**malinowy**



**Stilaxx**®  
**Pastyłki na Kaszel**  
*dla wszystkich grup wiekowych*

- Szybka ulga w suchym kaszlu
- Kojąca warstwa ochronna zapewniająca szybką ulgę
- Do stosowania pomiędzy dawkami syropu – jako uzupełnienie leczenia
- Pastyłki bez cukru



**Smak czarnej**  
**porzeczki**

**Stilaxx**®  
Na suchy Kaszel

1053 208.25

# Syrop Przeciwkaszlowy

**junior**

- + Porost islandzki
- + Korzeń prawoślazu
- + Korzeń lukrecji



**Szybkie**  
**ukojenie**

Instrukcja używania  
**Stilaxx**® syrop przeciwkaszlowy junior



Goodwill

# Instrukcja używania **Stilaxx®** syrop przeciwkaszlowy **junior**

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za wybór **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy junior**, wyrobu medycznego, który zapewni szybką ulgę w suchym kaszlu. Przed zastosowaniem prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zachowaj instrukcję – może być pomocna później. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

## Ulotka zawiera:

1. Co to jest **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy junior**?
2. Jakie składniki zawiera **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy junior**?
3. W jakim celu stosuje się **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy junior**?
4. Jak stosować **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy junior**?
5. Jakie są możliwe działania niepożądane?
6. Co należy wziąć pod uwagę przed zastosowaniem **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy junior**?
7. Jak należy przechowywać wyrób i jaki jest jego okres trwałości?
8. Dodatkowe informacje na temat **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy junior**

## 1. Co to jest **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy junior**?

Ekstrakty roślinne zawarte w preparacie **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy junior** tworzą fizyczną warstwę ochronną na błonach śluzowych, pomagając zmniejszyć potrzebę kaszlu.

**Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy junior** to roślinny środek przeciwkaszlowy dla dzieci, stosowany w leczeniu suchego kaszlu.

**Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy junior** jest oparty na roślinach, nie zawiera alkoholu ani cukru.

## 2. Jakie są składniki leku **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy junior**?

- 10 ml **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy junior** zawiera:
- 2,5 g płynnego ekstraktu z porostu islandzkiego
  - 1,5 g płynnego ekstraktu z korzenia prawoślazu
  - 0,75 g płynnego ekstraktu z korzenia lukrecji

Pozostałe składniki: roztwór maltitolu, sorbinian potasu, guma ksantanowa, naturalny aromat malinowy.

**Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy junior** nie zawiera sztucznych barwników, aromatów, laktozy i glutenu.

## 3. W jakim celu stosuje się **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy junior**?

Składniki preparatu **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy junior** tworzą ochronny film, powlekający błony śluzowe jamy ustnej i gardła niczym balsam. Chroni to podrażnione błony śluzowe i pomaga im szybciej się zregenerować dzięki łagodzącemu działaniu substancji śluzowych.

**Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy junior** stosuje się w przypadku suchego kaszlu oraz podrażnień błon śluzowych jamy ustnej i gardła, np. przy odruchu kaszlu i podrażnieniach gardła.

**Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy junior** czerpie swoje łagodzące działanie z ekstraktów roślinnych z mchu islandzkiego, korzenia prawoślazu i korzenia lukrecji. Potrójny kompleks islandzkiej formuły zapewnia szybką ulgę w kaszlu.

**Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy junior** jest odpowiedni do stosowania zarówno w ciągu dnia, jak i przed snem. Dzięki kojącemu działaniu służy zapewni spokojny sen.

## 4. Jak stosować **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy junior**?

**Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy junior** należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Wiek	Dawkowanie
Niemowleta (1 – 3 lata)	Do 4 razy dziennie po 2,5 ml <b>Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy junior</b>
Dzieci (4 – 11 lat)	Do 4 razy dziennie po 5 ml <b>Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy junior</b>
Młodzież (12 – 17 lat)	Do 4 razy dziennie po 7,5 ml <b>Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy junior</b>

Dorosłym (w wieku 18 lat i starszym) zaleca się stosowanie leku **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy** dla dorosłych. Nie ma doświadczenia w stosowaniu leku **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy junior** u niemowląt w wieku poniżej 12 miesięcy, dlatego należy go stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

## Sposób użycia

Do przyjmowania leku **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy junior** należy używać dołączonej miarki. Zaleca się przyjmowanie leku **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy junior** rano, (w południe) i wieczorem. Przed połknięciem należy odczekać około 30 sekund, aż preparat rozpuści się w ustach, aby zapewnić optymalne pokrycie błony śluzowej. Przed użyciem wstrząsnąć butelką.

## Stosowanie z innymi lekami

**Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy junior** może być stosowany z innymi produktami, takimi jak leki na przeziębienie. Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu innych leków, także tych kupionych samodzielnie.

## Czas stosowania

Regularne stosowanie leku **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy junior** jest niezbędne do skutecznego leczenia. Ze względu na dobrą tolerancję lek **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy junior** może być stosowany przez dłuższy czas. Czas trwania leczenia powinien wynosić co najmniej 5 dni. Aby uzyskać trwałą ulgę, należy kontynuować stosowanie leku **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy junior** nawet po ustąpieniu objawów.

## 5. Jakie są możliwe działania niepożądane?

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak łagodne wzdęcia. Ze względu na zawartość bezcukrowego roztworu maltitolu, spożycie nadmiernych ilości może wywołać efekt przeczyszczający.

Obecnie nie są znane żadne inne działania niepożądane. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek działania niepożądane, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

## 6. Co należy wziąć pod uwagę przed zastosowaniem **Stilaxx® syropu przeciwkaszlowego**?

**Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy junior** nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości (alergii) na którykolwiek składnik **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy junior**.



Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszelkich schorzeniach lub alergiach. Jeśli objawy nie ustąpią lub nasilą się w ciągu 2 tygodni, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

**Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy junior** zawiera wysokiej jakości ekstrakty roślinne. Ze względu na te naturalne składniki może czasami wystąpić lekkie zmętnienie i niewielkie zmiany smaku. Nie ma to wpływu na wysoką jakość i skuteczność leku **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy junior**.

## 7. Jak należy przechowywać wyrób i jaki jest jego okres trwałości?

Data ważności produktu **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy junior** jest wydrukowana na opakowaniu. Nie należy używać tego produktu po upływie podanej daty ważności. Po otwarciu produkt należy zużyć w ciągu 4 tygodni.

## Sposób przechowywania

-  **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy junior** należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
-  Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## 8. Dodatkowe informacje na temat **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy junior**

### Postać

Syrop doustny

### Opakowanie

Butelka 100 ml

### Data opracowania

Lipiec 2025



### Producent

KOSAN Pharma GmbH  
Anton-Bruckner-Strasse 5  
4863 Seewalchen  
Austria



### Dystrybutor

Goodwill Pharma Polska Sp. z o.o.  
ul. Bonifraterska 17,  
00-203 Warszawa,  
Polska

**KOSAN PHARMA** 

**CE** Wyrób medyczny

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z zespołem **Stilaxx®**

Tel.: +48 787 992 797

E-mail: [biuro@goodwillpharma.com](mailto:biuro@goodwillpharma.com)

[www.stilaxx.pl](http://www.stilaxx.pl)

Każdy poważny incydent związany z użytkowaniem niniejszego wyrobu, w tym jego wadliwe działanie, skutkujące zagrożeniem dla zdrowia lub życia, należy zgłosić do odpowiednich organów krajowych. W Polsce organem właściwym do przyjmowania zgłoszeń jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL). Zgłoszenia mogą być dokonywane przez użytkowników, pacjentów oraz pracowników służby zdrowia poprzez system raportowania dostępny na stronie internetowej URPL.