

Stilaxx® Rodzina produktów



Stilaxx®
Syrop Przeciwkaszlowy
dla dorosłych

- Szybka ulga w suchym kaszlu
- Dla dorosłych i młodzieży od 12. roku życia
- Bez alkoholu i bez cukru
- Odpowiedni do stosowania w dzień i w nocy



Smak
ziołowy



Stilaxx® junior
Syrop Przeciwkaszlowy
dla dzieci

- Szybka ulga w suchym kaszlu
- Dla dzieci i maluchów od 1. roku życia
- Smak przyjazny dla dzieci
- Bez alkoholu i bez cukru
- Odpowiedni do stosowania w dzień i w nocy



Smak
malinowy



Stilaxx®
Pastyłki na Kaszel
dla wszystkich grup wiekowych

- Szybka ulga w suchym kaszlu
- Kojąca warstwa ochronna zapewniająca szybką ulgę
- Do stosowania pomiędzy dawkami syropu – jako uzupełnienie leczenia
- Pastyłki bez cukru



Smak czarnej
porzeczki

Stilaxx®
Na suchy Kaszel



Syrop Przeciwkaszlowy

+ Porost islandzki
+ Korzeń prawoślazu
+ Korzeń lukrecji



Szybkie
ukojenie

Instrukcja używania
Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy

Instrukcja używania

Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za wybór **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy**, wyrobu medycznego, który zapewni szybką ulgę w suchym kaszlu. Przed zastosowaniem prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zachowaj instrukcję – może być pomocna później. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Ulotka zawiera:

1. Co to jest **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy**?
2. Jakie składniki zawiera **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy**?
3. W jakim celu stosuje się **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy**?
4. Jak stosować **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy**?
5. Jakie są możliwe działania niepożądane?
6. Co należy wziąć pod uwagę przed zastosowaniem **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy**?
7. Jak należy przechowywać wyrób i jaki jest jego okres trwałości?
8. Dodatkowe informacje na temat **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy**

1. Co to jest **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy**?

Ekstrakty roślinne zawarte w **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy** tworzą fizyczną warstwę ochronną na błonach śluzowych za pomocą śluzu, pomagając zmniejszyć potrzebę kaszlu.

Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy jest stosowany w leczeniu suchego kaszlu.

Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy jest oparty na roślinach, nie zawiera alkoholu ani cukru.

2. Jakie składniki zawiera **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy**?

- 10 ml **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy** zawiera:
- 2,5 g płynnego ekstraktu z porostu islandzkiego
 - 1,5 g płynnego ekstraktu z korzenia prawoślazu
 - 0,75 g płynnego ekstraktu z korzenia lukrecji

Pozostałe składniki: roztwór maltitolu, sorbinian potasu, guma ksantanowa, naturalna mieszanka olejków ziołowych.

Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy nie zawiera sztucznych barwników, aromatów, laktozy i glutenu.

3. W jakim celu stosuje się **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy**?

Składniki preparatu **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy** tworzą ochronny film, powlekający błony śluzowe jamy ustnej i gardła niczym balsam. Chroni to podrażnione błony śluzowe i pomaga im szybciej się zregenerować dzięki łagodzącemu działaniu substancji śluzowych.

Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy stosuje się w przypadku suchego kaszlu oraz podrażnień błon śluzowych jamy ustnej i gardła, np. przy odruchu kaszlu i podrażnieniach gardła.

Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy czerpie swoje łagodzące działanie z ekstraktów roślinnych z mchu islandzkiego, korzenia prawoślazu i korzenia lukrecji. Potrójny kompleks islandzkiej formuły zapewnia szybką ulgę w kaszlu.

Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy jest odpowiedni do stosowania zarówno w ciągu dnia, jak i przed snem. Dzięki kojącemu działaniu śluzu zapewnia spokojny sen.

4. Jak stosować **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy**?

Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dla dzieci i niemowląt w wieku od 1 do 3 roku życia zaleca się stosowanie produktu **Stilaxx® yrop przeciwkaszlowy junior**. Nie ma doświadczenia w stosowaniu produktu **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy** u niemowląt w wieku poniżej 12 miesięcy, dlatego należy go stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Wiek	Dawkowanie
Dorośli (18 lat i powyżej)	Do 4 razy dziennie po 10 ml Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy
Młodzież (12 – 17 lat)	Do 4 razy dziennie po 7,5 ml Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy
Dzieci (4 – 11 lat)	Do 4 razy dziennie po 5 ml Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy

Sposób użycia

Do przyjmowania leku **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy** należy używać dołączonej miarki. Zaleca się przyjmowanie leku **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy** rano, (w południe) i wieczorem. Przed połknięciem należy odczekać około 30 sekund, aż preparat rozpuści się w ustach, aby zapewnić optymalne pokrycie błony śluzowej. Przed użyciem wstrząsnąć butelką.

Stosowanie z innymi lekami

Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy może być stosowany z innymi produktami, takimi jak leki na przeziębienie. Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu innych leków, także tych kupionych samodzielnie.

Cięża i karmienie piersią

Nie ma przeciwwskazań do stosowania tego produktu w okresie ciąży i karmienia piersią. Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czas stosowania

Regularne stosowanie **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy** jest niezbędne do skutecznego leczenia. Ze względu na dobrą tolerancję **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy** może być stosowany przez dłuższy czas. Czas trwania kuracji powinien wynosić co najmniej 5 dni. Aby uzyskać trwałą ulgę, należy kontynuować stosowanie **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy** nawet po ustąpieniu objawów.

5. Jakie są możliwe działania niepożądane?

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak łagodne wzdęcia. Ze względu na zawartość bezcukrowego roztworu maltitolu, spożycie nadmiernych ilości może wywołać efekt przeczyszczający.

Obecnie nie są znane żadne inne działania niepożądane. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek działania niepożądane, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

6. Co należy wziąć pod uwagę przed zastosowaniem **Stilaxx® syropu przeciwkaszlowego**?

Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości (alergii) na którykolwiek składnik **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy**.


Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszelkich schorzeniach lub alergiach. Jeśli objawy nie ustąpią lub nasiliły się w ciągu 2 tygodni, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.


Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy zawiera wysokiej jakości ekstrakty roślinne. Ze względu na te naturalne składniki może czasami wystąpić lekkie zmętnienie i niewielkie zmiany smaku. Nie ma to wpływu na wysoką jakość i skuteczność leku **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy**.

7. Jak należy przechowywać wyrób i jaki jest jego okres trwałości?

Data ważności produktu **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy** jest wydrukowana na opakowaniu. Nie należy używać tego produktu po upływie podanej daty ważności. Po otwarciu produkt należy zużyć w ciągu 4 tygodni.

Sposób przechowywania

 **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy** należy przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

 Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

8. Dodatkowe informacje na temat **Stilaxx® syrop przeciwkaszlowy**

Postać

Syrop doustny

Opakowanie

Butelka 200 ml

Data opracowania

Lipiec 2025



Producent

KOSAN Pharma GmbH
Anton-Bruckner-Strasse 5
4863 Seewalchen
Austria



Dystrybutor

Goodwill Pharma Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17,
00-203 Warszawa,
Polska

KOSAN PHARMA 

CE Wyrób medyczny

W razie jakiegokolwiek pytań prosimy o kontakt z zespołem **Stilaxx®**

Tel.: +48 787 992 797

E-mail: biuro@goodwillpharma.com

www.stilaxx.pl

Każdy poważny incydent związany z użytkowaniem niniejszego wyrobu, w tym jego wadliwe działanie, skutkujące zagrożeniem dla zdrowia lub życia, należy zgłosić do odpowiednich organów krajowych. W Polsce organem właściwym do przyjmowania zgłoszeń jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL). Zgłoszenia mogą być dokonywane przez użytkowników, pacjentów oraz pracowników służby zdrowia poprzez system raportowania dostępny na stronie internetowej URPL.